

ИНСТРУКЦИЯ
по применению НОВАТАН 50
для повышения аппетита и нормализации минерального обмена
у крупного рогатого скота

(организация-производитель «TECHNA FRANCE NUTRITION S.A.S.» /
«ТЕХНА ФРАНС НУТРИШЕН С.А.С.», Франция)

I. Общие сведения

1. НОВАТАН 50 (NOVATAN 50) - кормовая добавка для повышения аппетита и нормализации минерального обмена у крупного рогатого скота.

2. Кормовая добавка в 1 кг содержит: сульфат натрия – не менее 22,40%, сульфат цинка - не менее 14,40%, сульфат марганца – не менее 14,40%, эфирные масла (эвгенол, тимол) - не менее 0,68%, наполнитель (сепиолит, известняк)- до 100%.

Добавка кормовая НОВАТАН 50 не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов. Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. По внешнему виду НОВАТАН 50 представляет собой порошок серого цвета, плохо растворимый в воде.

Добавка кормовая НОВАТАН 50 не должна применяться по истечении срока годности.

Выпускают добавку расфасованной по 25 кг, в многослойные бумажные мешки с внутренней полиэтиленовой прокладкой.

4. Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, состава и гарантировемых показателей, назначения и способа применения добавки, массы нетто, информации о подтверждении соответствия, номера партии, номера государственной регистрации, даты изготовления, срока и условий хранения, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в упаковке производителя в сухом, хорошо проветриваемом защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 10 °C до плюс 35°C и относительной влажности не более 80 %.

Срок хранения добавки – 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Добавка не должна применяться по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Эффективность действия НОВАТАН 50 основана на синергетической активности эфирных масел (эвгенол, тимол) и микроэлементов (марганец и цинк) в специальной форме, которые способствуют уменьшению процесса расщепления белка в рубце и нормализации состояния рубца молочных коров по продуктам метаболита (NH_3).

III. Порядок применения

6. НОВАТАН 50 применяют для повышения аппетита и нормализации минерального обмена у крупного рогатого скота.

7. НОВАТАН 50 вносят в комбикорма и кормосмеси на комбикормовых заводах или кормоцехах путем смещивания с зерновой группой, используя существующие технологии.

Норма ввода:

- телятам 20-30 г/гол/сутки;
- крупному рогатому скоту 30-50 г/гол/сут.

8. Побочных явлений и осложнений при применении НОВАТАН 50 в рекомендуемых количествах не отмечено. Противопоказаний не установлено.

9. НОВАТАН 50 совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.

10. Продукцию животноводства после применения добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

11. При работе с НОВАТАН 50 необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками: использовать средства индивидуальной защиты (защитную маску или респиратор, защитные очки, перчатки).

12. При попадании добавки в глаза – промыть большим количеством проточной воды; при попадании на кожу – смыть водой с мылом; загрязненные предметы одежды следует немедленно снять; при вдыхании – вывести на свежий воздух; обратиться к врачу.

13. Добавку следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ООО «Лафид» (МО, г. Мытищи) с организацией-производителем «ТЕХНА ФРАНС НУТРИШЕН С.А.С.» (Франция).

Адрес организации-производителя: «TECHNA FRANCE NUTRITION S.A.S.» Route de St. Etienne de Montluc, BP 10, 44220 Couëron – FRANCE.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению НОВАТАН 50, утвержденная Россельхознадзором 3 июня 2013 года.

Регистрационный номер ПВИ-2-1.8/02382